FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI
Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

RECOMENDACIONES POST - POLIPECTOMIA GÁSTRICA

CUIDADOS

- Comida liviana las primeras 24 horas posterior al procedimiento (Arroz, ensaladas sencillas sin salsas, proteína a la plancha, abundantes líquidos, consomé, evitar alimentos que generen gas (granos), evitar lácteos).
- No alimentos rojos durante 3 días después del procedimiento, posteriormente podrá volver a su dieta habitual.
- Se recomienda que permanezca en reposo relativo, no debe conducir después del procedimiento
- No realizar ejercicio, ni esfuerzo físico mayor (levantamiento de peso) por los siguientes 3 Días.

SIGNOS DE ALARMA

- Vigilar sangrado (vomito sanguinolento y/o concho café , deposición con sangre o negras).
- Dolor abdominal intenso persistente.
- Fiebre (temperatura >= 38.5°).

Si presenta alguno de los anteriores síntomas u otro que le llame la atención consulte inmediatamente al servicio de urgencias.

Recuerde que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes, el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su Médico tratante.

VIGILADO Supersalud
Línea Gratuita Nacional: 018000120970
Línea Gratuita Nacional: 018000120970

Para mayor información, por favor comuníquese al
Tel: 3319090 Ext. 3152–4154

Excelencia
INSTITUCIÓN ACREDITADA CON EXCELENCIA
Certificado N° 018

FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

CUIDADOS GENERALES POST PROCEDIMIENTO ENDOSCÓPICO BAJO SEDACIÓN

CUIDADOS

- El paciente tiene alto riesgo de caída, Debe salir acompañado de la clínica.
- No conducir ningun tipo de vehiculo, ni ser pasajero de moto, exponerse a alturas. No debe deambular y hacer actividades solo.
- Puede iniciar su dieta normal posterior al egreso, Excepto si hay alguna restricción por parte del médico.
- Al llegar a su casa se sugiere descansar.

SIGNOS DE ALARMA

- Vigilar sangrado (vomito sanguinolento y/o concho café, deposición con sangre o negras. (puede presentar pequeñas pintas de sangre por boca o recto según procedimiento y deberán ser de color café o vinotinto normalmente).
- Dolor Intenso que no mejora
- Fiebre (Temperatura >= 38.5°).
- En el sitio que se canalizo la vena, se dejara una cura la cual se debe retirar a las 24 horas (Esto evitara riesgo de infección). Consulte si presenta en el sitio de la canalización piel roja (Eritema), sensación de dolor y calor en la zona.

Si presenta alguno de los anteriores síntomas descritos u otro que le llame la atención consulte inmediatamente al servicio de urgencias.

Debe salir en silla de ruedas, en compañía de su familiar y patinador por protocolo de seguridad institucional para evitar una caída.

Recuerde que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes, el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su Médico tratante.

VIGILADO Supersalud
Línea Gratuita Nacional: 018000120970
Línea Gratuita Internacional: +5491161533925

Para mayor información, por favor comuníquese al
Tel: 3319090 Ext. 3152–4154

Excelencia
Certificado N° 015