


NUTRICIÓN PARENTERAL

Administración directa a la circulación venosa.



Se utiliza en personas que no pueden utilizar normalmente su sistema digestivo.
Compuesta por nutrientes necesarios: carbohidratos, proteínas, grasa, vitaminas y minerales

2 MANERAS DE SUMINISTRAR:

- *Continua: cada 24 horas.*
- *Cíclica: de 12 a 16 horas, según la condición del paciente.*

GENERALIDADES

- Se debe realizar con la bomba de infusión suministrada por la institución.
- La conexión al paciente y su retiro diario, será realizada por la Unidad de Cuidado Domiciliario.
- La familia no debe manipular la bomba de infusión ni la nutrición parenteral, con excepción de los momentos de contingencia.
- La mezcla de la nutrición parenteral debe permanecer homogénea, si observa partículas diferentes se debe suspender y comunicarlo a la Unidad de Cuidado Domiciliario.
- La velocidad de infusión puede variar cada día ya que depende de la cantidad de cada componente formulado por el médico.

IMPORTANTE



- *Que el encargado reciba la Nutrición Parenteral y preserve la temperatura a la cual es entregada.*
- *Mantener conectada la bomba de infusión a una fuente de energía constante. En caso de descargarse la batería, informar a la Unidad de Cuidado Domiciliario para reemplazarla.*
- *Indicar los cuidados del paciente al acompañante secundario, en caso de ausencia o cambio.*
- *Antes y después de tocar al paciente, lavarse las manos para evitar contaminación del catéter.*

¡PREVENGA LA INFECCIÓN!



- *Evitar mojar el sitio del catéter, puede cubrirse con plástico.*
- *En caso de desprendimiento del apósito o cualquier anomalía comunicarse inmediatamente con la Unidad de Cuidado Domiciliario.*
- *Evitar la exposición del catéter a un ambiente diferente al domicilio (centros comerciales – fincas – paseos – viajes largos programados).*



Al detectar abultamiento y/o ardor en el sitio de la inserción del catéter durante el paso de la TPN, detenga inmediatamente la infusión, e informe a la Unidad de Cuidado Domiciliario.



Vigilar Diariamente

- **Signos de infección.**
- **En el sitio de inserción del catéter:** Enrojecimiento, calor, dolor, secreción o inflamación.
- **Buen funcionamiento de la bomba de infusión.**
- **Deshidratación.**
- **Boca seca o pegajosa, sed insaciable, disminución o ausencia de orina, somnolencia, ausencia de lágrimas, piel seca, ojos hundidos.**

Dudas o inquietudes:
Unidad de Extensión Domiciliario 3218907289