

04 CONSULTE SI PRESENTA:

- Temperatura superior a 38,8 °C o escalofrío.
- Dolor persistente que no disminuye con medicamentos.
- Sangrado abundante y con mal olor, o secreciones con pus (materia).
- Enrojecimiento, endurecimiento o calor excesivo en los senos.
- Dificultad para realizar lactancia (no hay salida de leche).
- Inflamación progresiva o enrojecimiento alrededor de la herida.
- Dificultad para orinar o hacer deposición.
- Abdomen inflamado.
- Salida u obstrucción de la sonda (si tiene).

** Es normal sentir dolor en el sitio de la cirugía, presentar náuseas o vómito ocasionalmente (si son persistentes, consulte).*

05 SI TIENE SONDA VESICAL

- Realice lavado de manos antes y después de manipular la sonda.
- Fije la bolsa de drenaje al muslo y asegúrese de que no se doble.
- Evacúe la bolsa por tubo o drenaje.
- Cierre la pinza del tubo antes de desechar la orina.
- Verifique que el tubo no quede pinzado después de desechar.
- La sonda será retirada por el médico aproximadamente 10 días después de la cirugía.
- Los puntos serán retirados por el médico a los 15 días.

06 MEDICAMENTOS

- Tome sus medicamentos en el horario y la dosis fijada por el médico.
- Informe al personal especializado si toma medicamentos adicionales para tratar alguna enfermedad.

www.valledellili.org

331 9090 ext. 7344

**CUIDADOS
POSTOPERATORIOS**



Certificado N° 015