


# Signos de alarma



Los tratamientos conllevan a una serie de efectos secundarios que son esperados y pasajeros; sin embargo, existen algunos signos y síntomas graves y por ende deben ser atendidos lo más pronto posible. Es importante que el paciente no tome ningún medicamento o remedio natural sin antes haberlo consultado con su médico tratante.

## Consulten al servicio de urgencias si el paciente presenta:

- Temperatura mayor o igual a 38,3 °C.
- Dolor intenso y persistente.
- Pérdida de la conciencia o la memoria.
- Movimientos anormales.
- Desvanecimientos o desmayos.
- Estreñimiento severo (5 días o más).
- No producción de orina o dolor intenso al orinar.
- Sangrados: orina con sangre, deposición con sangre, vómito con sangre, puntos morados o rojos por todo el cuerpo y moretones sin causa.
- Sensación de ahogo o asfixia, respiración con esfuerzo y/o silbido.
- Hinchazón, enrojecimiento, calor, dolor y/o ardor en el sitio donde tenga el catéter (si lo tiene).
- Mas de 4 deposiciones líquidas y abundantes en un día, por encima de lo que realiza normalmente.
- Más de 4 episodios de vómito abundante en un día.
- Imposibilidad para tragar alimentos líquidos.
- Pérdida de fuerza o sensibilidad en una extremidad de forma repentina.

