

## Signos y síntomas de alarma

### Paciente **anticoagulado**

- ◆ Dolor de cabeza repentino, persistente y muy intenso.
- ◆ Mareo, desmayo o pérdida repentina del conocimiento.
- ◆ Debilidad o pérdida de fuerza repentina en una extremidad o en un lado del cuerpo.
- ◆ Repentina dificultad para hablar.
- ◆ Dolor intenso y persistente en una articulación (tobillo, rodilla, muñeca, codo, hombro o cadera).
- ◆ Visión borrosa repentina y persistente.
- ◆ Dolor opresivo en el pecho, con o sin falta de aire.
- ◆ Sangrado intenso por la nariz o la boca.
- ◆ Orina de color rosado, rojizo o marrón.
- ◆ Vómito con sangre.
- ◆ Deposiciones negras, malolientes o con sangre roja brillante.
- ◆ Si tiene una herida que no para de sangrar a pesar de hacerle compresión.

### ¿Qué hacer?

Comuníquese inmediatamente con un servicio de emergencia médica domiciliaria o acuda pronto al servicio de urgencias más cercano.



## Informe al **personal de salud:**

- ◆ Que usted es paciente anticoagulado.
- ◆ Nombre y dosis del anticoagulante.
- ◆ Fecha de la última dosis recibida.
- ◆ Razón por la cual usted se encuentra anticoagulado.

## **Comuníquese con la Clínica de Anticoagulación e informe la situación:**

Brindaremos información adicional al personal que lo está atendiendo, estaremos atentos a su evolución y a los cambios que se deban realizar en su tratamiento.



Certificado N° 015

Para comentarios y sugerencias  
contacte al Servicio de Integración  
y Atención al Usuario - SIAU  
Ext. 4190 - 4191 - 4192  
[siau@fvl.org.co](mailto:siau@fvl.org.co)

### **Síguenos en:**



Av. Simón Bolívar Cra 98 # 18-49 PBX (57)(2) 331 90 90

SERVICIO DE CARDIOLOGÍA - CLÍNICA DE ANTICOAGULACIÓN

Tel: 331 9090 ext. 7426 - 7485

cel: 313 799 1462