



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Efectos emocionales y sexualidad


Durante el tratamiento **oncológico**

El cáncer **no es una enfermedad contagiosa ni transmisible**, sin embargo, el paciente y su pareja pueden tener incertidumbre acerca de la sexualidad.

Durante el tratamiento podría perderse el interés por tener relaciones sexuales, debido a que **algunos medicamentos ocasionan disminución de la energía física y la libido**.

No obstante, se puede tener otras **manifestaciones de cariño con la pareja**: besos, abrazos, caricias, entre otros.






En algunas personas el deseo sexual no se ve afectado, sin embargo, es importante aplicar medidas preventivas:

- o Evitar las relaciones sexuales durante la hospitalización, debido a que existe un mayor riesgo de contraer infecciones de todo tipo. Al igual que durante los días de quimioterapia y hasta 3 días después, pues algunos medicamentos se eliminan a través de fluidos corporales.
- o Consultar con el médico tratante antes de consumir algún medicamento para la actividad sexual o usar elementos estimuladores, ya que estos podrían interferir con el tratamiento

Los cambios en el aspecto corporal pueden influir en los sentimientos y apetito sexual. Por esta razón, es necesario compartir las dudas con la pareja para que juntos puedan **enfrentar los temores e inquietudes y llevar a cabo una vida sexual que se ajuste a la condición.**



Algunos tratamientos pueden tener efectos secundarios que influyen en la actividad sexual,

pues pueden generar impotencia, infertilidad, resequedad vaginal, estrechez vaginal, entre otros; esto debe dialogarse con el médico tratante para definir la participación de otro profesional de la salud en el cuidado integral; ejemplo: valoración por psicología, trabajo social o psiquiatría.

