

Quimioterapia ABVD:

Plan de tratamiento con doxorribicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina

Ciclos de quimioterapia: es la aplicación de los medicamentos seguido de unos días de descanso.

- 0 Por lo general, se suministran 6 ciclos de quimioterapia.
- 0 Comienzan a contar desde el día en que se suministran los medicamentos por primera vez.
- 0 Cada ciclo consta de dos aplicaciones de medicamentos (cada 15 días).
- 0 La duración de cada ciclo es de 28 días (el día 29 comienza el siguiente ciclo).
- 0 Se puede administrar de forma intrahospitalaria o en la sala de quimioterapia ambulatoria.

¿Cómo se suministra?

- 0 A través de las venas, por un catéter central.
- 0 Acompañados de medicamentos para prevenir las náuseas y el vómito.
- 0 Puede durar entre 3 y 4 horas.

*Previo a los ciclos de quimioterapia se deben tomar exámenes de sangre para evaluar el estado del paciente. El médico tratante entregará las órdenes.

Informe a su médico tratante:

- 0 Si usted o su pareja se encuentra en embarazo o está amamantando durante el tratamiento, ya que estos medicamentos pueden interferir con la salud del bebé.
- 0 Los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.
- 0 Requiere radioterapia y está recibiendo este plan de tratamiento.



Precauciones:

- Estos medicamentos podrían producir infertilidad, si se encuentra en edad fértil debe realizar valoración con el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología para definir el método anticonceptivo más apropiado. Recuerde consultar con su médico tratante antes del inicio de cualquier medicamento.
- En ocasiones se requiere **pegfilgrastim**, un medicamento que ayuda a mejorar las defensas. Este se suministra 24 horas después de la infusión de la quimioterapia a través de una inyección subcutánea (debajo de la piel) o bien, el mismo día de la quimioterapia, con un dispositivo denominado OBI, consulte con Enfermería sus cuidados.
- Consuma abundante líquido (8 a 10 vasos al día), para proteger los riñones.
- Evite consumir bebidas alcohólicas durante el tratamiento.
- Informe inmediatamente cualquier sensación de ardor, escozor o dolor en la zona de aplicación del medicamento.

Efectos secundarios del tratamiento:

- Náuseas, vómito y diarrea.
- Lesiones en las mucosas de la boca (llagas).
- Pérdida del pelo y vello corporal.
- Cansancio.
- Disminución de las defensas y las plaquetas: puede generar sangrados.
- Dificultad para respirar, tos y dolor en el pecho.
- Reacciones alérgicas: sarpullido o hinchazón de la cara.
- La doxorubicina puede generar alteraciones en el corazón.
- Dolor en los huesos.

Si presenta síntomas o cambios que no estén descritos anteriormente, informe a su médico en la consulta. Si algún síntoma es severo comuníquese con Enfermería de educación oncológica. Si tiene síntomas graves que necesitan atención inmediata, consulte a urgencias.



Síguenos en:



fvcali



fvltv



@FVLCali



@fundacionvalledelili



Fundacion Valle del lili