FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Quimioterapia KD:

Plan de tratamiento con carfilzomib y dexametasona

Ciclos de quimioterapia: es la aplicación de los medicamentos seguido de unos días de descanso.

- El número de ciclos es determinado por el médico tratante.
- Comienzan a contar desde el día en que se suministran los medicamentos por primera vez.
- La duración de cada ciclo es de 28 días.
- Se puede administrar de forma intrahospitalaria o en la sala de quimioterapia ambulatoria.

¿Cómo se suministra?

- **Carfilzomib:** a través de las venas, en un tiempo de 15 a 30 minutos según la dosis, durante dos días consecutivos, por tres semanas. El período de descanso es de 12 días. Cada período de 28 días se considera como un ciclo de tratamiento.
- **Dexametasona:** a través de las venas o por la boca. Se aplica los mismos días del carfilzomib.

*Previo a los ciclos de quimioterapia se deben tomar exámenes de sangre para evaluar el estado del paciente. El médico tratante entregará las órdenes.

Informe a su médico tratante:

- Si usted o su pareja se encuentra en embarazo o está amamantando durante el tratamiento, ya que estos medicamentos pueden interferir con la salud del bebé.
- Los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.

VIGILADO Supersalud

Precauciones

- **Estos medicamentos podrían producir infertilidad**, si se encuentra en edad fértil debe realizar valoración con el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología para definir el método anticonceptivo más apropiado. Recuerde consultar con su médico tratante antes del inicio de cualquier medicamento.

- Consuma abundante líquido (8 a 10 vasos al día), para proteger los riñones.

- Evite consumir bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

Efectos secundarios del tratamiento:

- Náuseas, vómito y diarrea o estreñimiento.
- Alteraciones en la piel, piel seca y picazón.
- Dolor muscular o articular.
- Cansancio.
- Disminución de las defensas y las plaquetas: puede generar sangrados.
- Dificultad para dormir.
- Dolor de cabeza.
- Tos o dificultad para respirar.
- Aumento del apetito.
- Coágulos en la sangre y alteraciones del corazón.
- Neuropatía periférica: debilidad, entumecimiento, hormigueo y dolor en los pies o las manos.

Si presenta síntomas o cambios que no estén descritos anteriormente, informe a su médico en la consulta. Si algún síntoma es severo comuníquese con Enfermería de educación oncológica. Si tiene síntomas graves que necesitan atención inmediata, consulte a urgencias.

Certificado N° 015

Síguenos en:

fvlcali fvltv @FVLCali @fundacionvalledelili Fundacion Valle del lili

Av. Simón Bolívar Cra 98 # 18-49 PBX (57)(2) 331 90 90

Av. Estación: Calle 23 DN #4N-21.

Sede Limonar: Carrera 70 #18-75

Ext. 7185 Atención 24 horas. **www.valledellili.org**