


Procedimientos quirúrgicos (cirugías) en pacientes anticoagulados

Los pacientes anticoagulados que requieren cirugías o procedimientos como: **endoscopias o colonoscopias**, deben evaluar con el equipo de la Clínica de Anticoagulación la suspensión o no de los medicamentos anticoagulantes, puesto que, en algunos casos, es necesario suspender el medicamento por el riesgo de sangrado, sin embargo, en procedimientos menores no es necesario.

*En caso de retirar el medicamento anticoagulante, se brindarán las recomendaciones para la suspensión y reinicio del mismo. Esto se conoce como **terapia puente**.*



Actividades educativas




Resuelva la sopa de letras encontrando las siguientes palabras:

- Cirugía
- Riesgos
- Consultar
- Suspensión
- Recomendaciones
- Alarma
- Terapia
- Seguimiento
- Anticoagulante
- Puente
- Procedimiento
- Control
- Sangrado
- Creatinina
- Médico

L	V	F	O	V	A	R	U	D	S	N	A	J	B	D	G	C	B	J
W	B	G	I	H	I	N	C	H	A	Z	O	N	J	R	K	H	V	A
X	T	I	D	G	S	Q	M	I	S	F	L	A	M	G	A	I	O	P
R	G	T	O	S	O	A	L	A	R	M	A	I	Z	A	N	K	B	R
E	O	S	B	A	U	W	U	P	Z	U	H	K	S	Q	T	A	C	O
C	R	E	A	T	I	N	I	N	A	S	G	V	F	N	I	G	Y	C
O	C	G	J	K	W	R	L	Q	D	Y	Z	I	O	T	C	W	X	E
M	L	A	U	Y	B	C	O	N	T	R	O	L	A	E	O	S	C	D
E	Z	D	R	X	A	Y	F	E	L	D	A	U	D	R	A	Y	O	I
N	Y	U	H	S	U	S	P	E	N	C	I	O	N	A	G	O	L	M
D	M	S	K	L	A	M	Z	E	W	E	U	L	R	P	U	Ñ	S	I
A	A	Y	F	H	I	N	R	O	L	R	E	R	O	I	L	Y	U	E
C	M	E	R	I	E	S	G	O	S	Ñ	C	K	L	A	A	C	L	N
I	K	Q	A	X	N	K	H	R	M	S	E	F	G	P	N	E	H	T
O	X	Q	S	S	C	S	A	E	A	I	B	G	S	U	T	M	A	O
N	B	W	M	E	D	I	C	O	Q	D	R	Y	I	E	E	S	R	J
E	P	A	X	C	S	F	Q	B	P	V	O	Y	K	N	G	D	Q	V
S	E	G	U	I	M	I	E	N	T	O	L	N	L	T	X	Y	V	A
C	A	F	A	L	S	A	P	O	A	G	V	L	A	E	V	O	I	B
R	I	J	B	R	E	S	H	I	X	I	F	W	S	U	W	A	Q	N
A	S	Z	D	B	N	A	C	O	N	S	U	L	T	A	R	D	S	Z

Resuelva el crucigrama:



Horizontales:

- 1 Área que evalúa si se requiere o no suspender el anticoagulante antes de la cirugía.
- 2 Tipo de Procedimiento que se pueden realizar sin suspender el anticoagulante.
- 3 Nombre de la terapia que se utiliza para suspender la anticoagulación.

Verticales:

- 4 Servicio al que debe acudir si presenta sangrado abundante en la zona de la herida después de la cirugía.
- 5 Tiempo (días previos) en el que se debe pedir la cita en Clínica de Anticoagulación antes de la cirugía.
- 6 Examen que debe presentar en la cita de Clínica de Anticoagulación antes de la cirugía para revisar el funcionamiento del riñón.



fvcali



fvltv



@FVLCali



@fundacionvalledelili



Fundacion Valle del lili

Servicio de Cardiología - Clínica de Anticoagulación

Tel: 331 9090 Ext. 7424

Cel: 313 799 1462

www.valledelili.org

Recomendaciones al suspender el medicamento para una cirugía

- Solicite una cita con la Clínica de Anticoagulación por lo menos **8 días antes del procedimiento**.
- Para la consulta, es necesario presentar un examen de creatinina sérica (no mayor a 1 mes), con el objetivo de conocer su función renal y definir indicaciones para la terapia puente.
- Conocer el procedimiento que le van a realizar.

La Clínica de Anticoagulación realizará seguimiento telefónico (evaluación de estado de salud) durante la terapia puente y reforzará la información brindada en el consultorio.

Después de la intervención, vigile la presencia de sangrado en la zona de la cirugía o procedimiento. Si el sangrado es abundante, consulte por urgencias, informe a su médico tratante y a la Clínica de Anticoagulación.

