

GAMMAGRAFÍA DE TIROIDES

Este procedimiento sirve para evaluar la estructura y funcionamiento de la glándula tiroides; mediante la administración de un medicamento radiactivo a través de las venas.

REQUISITOS PARA EL EXAMEN:

- Al solicitar la cita, informe si el paciente padece de claustrofobia, para que pueda solicitar al médico las órdenes y tramitar las autorizaciones de sedación o anestesia con su entidad de salud, de manera oportuna.
- Al momento de la cita, presente la orden médica, la autorización del procedimiento, resultados de exámenes de laboratorio solicitados y la historia clínica.
- Si por algún motivo no puede asistir a su cita o requiere información adicional, antes o después del procedimiento, comuníquese al teléfono (60 2) 3319090 ext. 3159.

PREPARACIÓN:

- Las mujeres en edad reproductiva (desde la primera menstruación hasta la menopausia post-quimioterapia) deben realizarse una prueba de embarazo en sangre, hasta tres días previos al procedimiento, a excepción de mujeres con histerectomía.
- Informe al personal de salud si se encuentra en período de lactancia.
- Los acompañantes de los pacientes deben ser personas con la capacidad de auxiliar al paciente si lo requiere (no embarazadas o menores).
- No requiere ayuno.
- No debe realizarse estudios con medio de contraste endovenoso 3 meses previos a la cita de la gammagrafía.

Nota: El contraste oral no afecta la programación del estudio de gammagrafía tiroides.

- No haberse tinturado el cabello 15 días antes del estudio.



- Porte consigo la historia clínica, listado de medicamentos que recibe actualmente y exámenes anteriormente realizados, relacionados al estudio programado, como: T3, T4, TSH y ecografía de tiroides si las tiene.
- No haberse realizado biopsias o punciones en el cuello 15 días antes del procedimiento. Después de la cirugía de cuello debe esperar un mes.
- 6 semanas antes suspenda la hormona tiroidea: levotiroxina sódica.
- 15 días antes suspenda: cremas térmicas con efecto frío/calor para adelgazar o mentoladas, linimentos, productos naturales a base de sábila o yodo; enjuagues bucales y bloqueador solar; aguas aromáticas, té, tisanas y medicamentos homeopáticos o multivitamínicos.
- 6 días previos suspenda los medicamentos anti tiroideos: propiltiouracilo, metimazol y medicamentos naturales.

DURACION:

- Se toman imágenes durante 20 minutos aproximadamente.
- Se debe disponer entre 1 y 2 horas para el estudio. Sin embargo, factores como retrasos en el programa, emergencias u otros, pueden retrasar su inicio o prolongar su duración.

RECOMENDACIONES LUEGO DEL PROCEDIMIENTO:

- 24 horas después de la administración del medicamento, el paciente no debe estar cerca a embarazadas, ni menores de 10 años, guardar mínimo 1 metro de distancia.
- Puede continuar tomando los medicamentos habituales.



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILLOS

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

- El resultado del estudio podrá encontrarlo en el PORTAL DEL PACIENTE a través de Mifundacion.fvl.org.co, recuerde actualizar su correo electrónico al momento de la cita.
- La entrega de resultados se realiza 5 días hábiles posteriores a la toma de la gammagrafía, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.



HORARIO DE ATENCIÓN PARA PROGRAMACIÓN DE CITAS Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Consulta Externa - Medicina Nuclear Molecular Tel: 60 2 3319090 Ext. 3159

VIGILADO Supersalud
Lugar de Atención al Paciente - Clínica S.C.
Código Único de Identificación: 01800010781

