

ENTEROSCOPIA DE DOS BALONES

Estudio endoscópico que se realiza bajo anestesia general, utilizando un equipo especializado largo y flexible, el cual permite la visualización de la parte interna del intestino delgado. Se utiliza para examinar y tratar lesiones intestinales.

Recomendaciones para el día previo al examen

- Tener una alimentación con dieta líquida 24 horas antes del examen. (Jugos claros, té, agua de panela, tisanas, consomé, gelatinas no rojas, agua).
- No tomar bebidas oscuras (café, malta, chocolates), ni ingerir lácteos.
- Alimentos que **no** están permitidos ni en poca cantidad: leche y sus derivados (yogurt, kumis, cremas, etc), alimentos sólidos.

Se debe comprar:

- 4 sobres **sobres grandes** de mínimo **110gr** de Nulitelly/ Travad Colon Peg/ Klean Prep, Clearovac, escoger entre las opciones. No se deben confundir con sobre pequeños para el manejo del estreñimiento.
- Metoclopramida (Plasil): tomar 1 tableta **si presenta vómito**.

Preparación:

- Inicie la ingesta de la preparación el día anterior al procedimiento a las **6:00 p.m.** Diluir primer sobre en 1 litro de agua. Tomar 1 vaso cada 10 o 20 minutos. Al terminar el primer sobre se debe repetir la preparación y consumo con el segundo sobre.
- A las **10:00 p.m.** diluir el tercer sobre en 1 litro de agua y tomar 1 vaso cada 10 o 20 minutos. Al terminarlo repetir preparación y consumo con el cuarto sobre.
- Al terminar los 4 sobres, se debe iniciar ayuno completo.

Recomendaciones

- Disolver el contenido de cada sobre de (Nulitelly/ Travad Colon Peg/ Klean Prep/ Clearovac) en un (1) litro de agua.
- Agite enérgicamente, utilizando preferiblemente un envase cerrado (con tapa).
- Debe mantener refrigerada la mezcla mientras la consume, de acuerdo a las instrucciones contenidas aquí (esto mejorará el sabor de la preparación).
- **Debe tomar toda la preparación**, ya que esta garantiza una buena limpieza del colon.
- Durante ese tiempo no puede ingerir alimentos sólidos, únicamente puede beber líquidos (agua, aromática, consomé, gelatinas no rojas, jugo de frutas colado sin leche y no rojos).

Nota: Si el paciente al tomar la preparación presenta vómito, debe tomar 1 tableta de Metoclopramida (plasil) esperar media hora y continuar con la preparación.

Después de haber tomado toda la preparación, las deposiciones deben ser totalmente líquidas y de color amarillo como si fueran orina o transparentes sin residuos.

El día del examen:

- Presentar la orden médica y la respectiva autorización de la entidad prestadora de salud.
- Presentar cédula original y 1 fotocopia del documento (solo para entidades del POS).
- Asistir a la cita 60 minutos antes de la hora asignada para el diligenciamiento de los respectivos trámites administrativos.
- Realizar ayuno de 8 horas (Estómago vacío).
- Asistir al procedimiento con acompañante mayor de edad.
- Si el paciente es menor de edad o con alteraciones neurológicas debe venir acompañado por familiar de primer grado de consanguinidad (mamá, papá, hermanos o representante legal) para la firma del consentimiento informado.
- No debe ingresar al procedimiento con reloj, joyas, celular o dinero. Todas las pertenencias deben ser entregadas al acompañante.
- Usar ropa cómoda y zapatos bajos y tener las uñas de las manos totalmente desmaquilladas.
- Traer jugo no ácido para tomar después del procedimiento (mango, manzana, pera o durazno)
- No suspender medicamentos de base.
- Si es diabético: no tomar hipoglucemiantes orales 24 horas antes del examen y el día del examen NO debe aplicarse insulina.
- Si el paciente toma aspirina no debe suspenderla, pero si toma warfarina o Antiplaquetarios, debe consultar con su médico tratante.

Duración: Disponer de mínimo 8 horas el día de la realización del procedimiento.

Unidad de Endoscopia
Tel: 602 3319090 Ext. 4126.