

Quimioterapia CYBORD:

Plan de tratamiento con ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona

Ciclos de quimioterapia: es la aplicación de los medicamentos seguido de unos días de descanso.

- Por lo general, se suministran de 4 a 6 ciclos de quimioterapia.
- Comienzan a contar desde el día en que se suministran los medicamentos por primera vez.
- La duración de cada ciclo es de 28 días.
- Se puede administrar de forma intrahospitalaria o en la sala de quimioterapia ambulatoria.

¿Cómo se suministra?

Los 3 medicamentos se aplican una o dos veces por semana, según indicación médica.

- **Bortezomib:** se inyecta debajo de la piel (vía subcutánea), en los muslos o el abdomen.
- **Ciclofosfamida:** a través de las venas, en un tiempo de 30 min a 1 hora.
- **Dexametasona:** a través de las venas o por la boca.

***Antes de los ciclos de quimioterapia** se deben tomar exámenes de sangre para evaluar el estado del paciente. El médico tratante entregará las órdenes.

Informe a su médico tratante:

- Si usted o su pareja se encuentra en embarazo o está amamantando durante el tratamiento, ya que estos medicamentos pueden interferir con la salud del bebé.
- Los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.

Precauciones

- 0 **Estos medicamentos podrían producir infertilidad**, si se encuentra en edad fértil debe realizar valoración con el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología para definir el método anticonceptivo más apropiado. Recuerde consultar con su médico tratante antes del inicio de cualquier medicamento.
- 0 Debe vaciar la vejiga (orinar) con frecuencia, para prevenir problemas de vejiga y riñón.
- 0 Consuma abundante líquido (8 a 10 vasos al día), para proteger los riñones.
- 0 Evite consumir bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

Efectos secundarios del tratamiento:

- 0 Náuseas, vómito y diarrea o estreñimiento.
- 0 Lesiones en la boca (llagas).
- 0 Ansiedad y alteraciones del sueño.
- 0 Dolor de cabeza, muscular o articular.
- 0 Cansancio y aumento del apetito.
- 0 Disminución de las defensas y las plaquetas.
- 0 Tos o dificultad para respirar.
- 0 **Dificultad para orinar o sangrado en la orina:** informe al personal de salud inmediatamente.
- 0 Entumecimiento u hormigueo en las extremidades.

Si presenta síntomas o cambios que no estén descritos anteriormente, informe a su médico en la consulta. Si algún síntoma es severo comuníquese con Enfermería de educación oncológica. Si tiene síntomas graves que necesitan atención inmediata, consulte a urgencias.



Síguenos en:



fvcali



fvltv



@FVLCali



@fundacionvalledelili



Fundacion Valle del lili

Av. Simón Bolívar Cra 98 # 18-49 PBX (57)(2) 331 90 90

Av. Estación: Calle 23 DN #4N-21.

Sede Limonar: Carrera 70 #18-75

Ext. 7185 Atención 24 horas. www.valledellili.org