



FUNDACIÓN  
VALLE DEL LILI

*Excelencia en Salud al servicio de la comunidad*

## Quimioterapia ESHAP:

Plan de tratamiento con etopósido, metilprednisolona, citarabina y cisplatino

**Ciclos de quimioterapia:** es la aplicación de los medicamentos seguido de unos días de descanso.

- 🕒 Por lo general, se suministran de 4 a 6 ciclos.
- 🕒 Comienzan a contar desde el día en que se suministran los medicamentos por primera vez.
- 🕒 La duración de un ciclo es de 21 o 28 días.
- 🕒 Se puede administrar de forma intrahospitalaria o en la sala de quimioterapia ambulatoria.

## ¿Cómo se suministra?

\***Previo a la quimioterapia** se ponen líquidos para hidratar al paciente y medicamentos para prevenir las náuseas y el vómito.

### Día 1ro al 4to del ciclo:

- 🕒 Todos los medicamentos de este plan se aplican a través de las venas, mediante un catéter central.
- 🕒 El tiempo de infusión de los medicamentos varía según el lugar donde se administren:
  - **Hospitalización:**
    - 🕒 Metilprednisolona: 30 minutos a 1 hora.
    - 🕒 Etopósido: entre 1 y 2 horas
    - 🕒 Cisplatino: continua durante 24 horas.
  - **Ambulatorio:** entre 12 y 14 horas.

## Día 5to:

- 
- 0 Se puede administrar un medicamento para los ojos (dexametasona o prednisolona cada 6 u 8 horas) para prevenir complicaciones oculares asociadas a la quimioterapia (citarabina).

**\*Antes de los ciclos de quimioterapia** se deben tomar exámenes de sangre para evaluar el estado del paciente. El médico tratante entregará las órdenes.

## Informe a su médico tratante:

- 0 Si usted o su pareja se encuentra en embarazo o está amamantando durante el tratamiento, ya que estos medicamentos pueden interferir con la salud del bebé.
- 0 Los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.

## Precauciones

- 0 **Después de la quimioterapia del primer día:**
  - Si el paciente se encuentra hospitalizado, se le tomarán exámenes 2 a 3 veces por semana.
  - Si recibe tratamiento ambulatorio: el médico ordenará los exámenes de control, para revisarlos durante la consulta.
- 0 **Estos medicamentos podrían producir infertilidad**, si se encuentra en edad fértil debe realizar valoración con el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología para definir el método anticonceptivo más apropiado. Recuerde consultar con su médico tratante antes del inicio de cualquier medicamento.
- 0 Evite consumir bebidas alcohólicas durante el tratamiento.
- 0 En ocasiones se requiere **pegfilgrastim**, un medicamento que ayuda a mejorar las defensas. Este se suministra 24 horas después de la infusión de la quimioterapia a través de una inyección subcutánea (debajo de la piel) o bien, el mismo día de la quimioterapia, con un dispositivo denominado OBI, consulte con Enfermería sus cuidados.
- 0 **Informe inmediatamente cualquier sensación de ardor, escozor o dolor en la zona de aplicación del medicamento.**

## Efectos secundarios del tratamiento:

- 0 Náuseas y vómito.
- 0 Lesiones en la boca (llagas).
- 0 Caída del pelo y vello corporal.
- 0 Cansancio.
- 0 Disminución de las defensas y las plaquetas.
- 0 Alteraciones de los riñones.
- 0 Sordera o sensación de zumbido.
- 0 Estreñimiento o diarrea.
- 0 Entumecimiento u hormigueo en las extremidades.
- 0 Dolor en los huesos.
- 0 Inflamación en los ojos.

**Si presenta síntomas o cambios que no estén descritos anteriormente, informe a su médico en la consulta. Si algún síntoma es severo comuníquese con Enfermería de educación oncológica. Si tiene síntomas graves que necesitan atención inmediata, consulte a urgencias.**



### Síguenos en:



fvlicali



fvltv



@FVLCali



@fundacionvalledelili



Fundacion Valle del lili

Av. Simón Bolívar Cra 98 # 18-49 PBX (57)(2) 331 90 90

Av. Estación: Calle 23 DN #4N-21.

Sede Limonar: Carrera 70 #18-75

Ext. 7185 Atención 24 horas. [www.valledellili.org](http://www.valledellili.org)