



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Quimioterapia R-CVP:

Plan de tratamiento con rituximab, ciclofosfamida, vincristina y prednisolona

Ciclos de quimioterapia: es la aplicación de los medicamentos seguido de unos días de descanso.

- Por lo general, se suministran de 6 a 8 ciclos de quimioterapia.
- Comienzan a contar desde el día en que se suministran los medicamentos por primera vez.
- La duración de cada ciclo es de 21 días.
- Se puede administrar de forma intrahospitalaria o en la sala de quimioterapia ambulatoria.

¿Cómo se suministra?

***Previo a la quimioterapia** se ponen líquidos para hidratar al paciente y medicamentos para prevenir las náuseas y el vómito.

Día 1 del ciclo:

- **Rituximab, ciclofosfamida y vincristina:** a través de las venas, mediante un catéter central.
- Tiempo de infusión: entre 6 y 8 horas.
- **Prednisolona:** por la boca, con el estómago lleno (después de las comidas).

Días 2 al 5 del ciclo:

- Prednisolona: por la boca, con el estómago lleno (después de las comidas).

***Antes de los ciclos de quimioterapia** se deben tomar exámenes de sangre para evaluar el estado del paciente. El médico tratante entregará las órdenes.



Informe a su médico tratante:

- 
- 0 Si usted o su pareja se encuentra en embarazo o está amamantando durante el tratamiento, ya que estos medicamentos pueden interferir con la salud del bebé.
 - 0 Los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.

Precauciones

- 0 **Estos medicamentos podrían producir infertilidad**, si se encuentra en edad fértil debe realizar valoración con el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología para definir el método anticonceptivo más apropiado. Recuerde consultar con su médico tratante antes del inicio de cualquier medicamento.
- 0 Debe vaciar la vejiga (orinar) con frecuencia, para prevenir problemas de vejiga y riñón.
- 0 Consuma abundante líquido (8 a 10 vasos al día), para proteger los riñones.
- 0 Evite consumir bebidas alcohólicas durante el tratamiento.
- 0 En ocasiones se requiere **pegfilgrastim**, un medicamento que ayuda a mejorar las defensas. Este se suministra 24 horas después de la infusión de la quimioterapia a través de una inyección subcutánea (debajo de la piel) o bien, el mismo día de la quimioterapia, con un dispositivo denominado OBI, consulte con Enfermería sus cuidados.
- 0 **Informe inmediatamente cualquier sensación de ardor, escozor o dolor en la zona de aplicación del medicamento.**

Efectos secundarios del tratamiento:

- 
- 0 Náuseas y vómito.
 - 0 Lesiones en la boca (llagas).
 - 0 Caída del pelo y vello corporal.
 - 0 Cansancio.
 - 0 Disminución de las defensas Y las plaquetas: puede generar sangrados.
 - 0 **Dificultad para orinar o sangrado en la orina:** informe a su médico de inmediato.

Efectos secundarios del tratamiento:

- Estreñimiento severo.
- Reacciones alérgicas: irritación, picazón o enrojecimiento de la piel.
- Dolor en los huesos.

Si presenta síntomas o cambios que no estén descritos anteriormente, informe a su médico en la consulta. Si algún síntoma es severo comuníquese con Enfermería de educación oncológica. Si tiene síntomas graves que necesitan atención inmediata, consulte a urgencias.



Certificado N° 023

Síguenos en:



fvcali



fvltv



@FVLCali



@fundacionvalledelili



Fundacion Valle del Lili

Av. Simón Bolívar Cra 98 # 18-49 PBX (57)(2) 331 90 90

Av. Estación: Calle 23 DN #4N-21.

Sede Limonar: Carrera 70 #18-75

Ext. 7185 Atención 24 horas. www.valledellili.org

