



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Quimioterapia EPOCH:

Plan de tratamiento con rituximab, etopósido, prednisolona, vincristina, ciclofosfamida y doxorubicina

Ciclos de quimioterapia: es la aplicación de los medicamentos seguido de unos días de descanso.

- 🕒 Por lo general, se suministran 6 y 8 ciclos.
- 🕒 Comienzan a contar desde el día en que se suministran los medicamentos por primera vez.
- 🕒 La duración de un ciclo es de 21 días.
- 🕒 Se puede administrar de forma intrahospitalaria o en la sala de quimioterapia ambulatoria.

¿Cómo se suministra?

*Previo a la quimioterapia se ponen líquidos para hidratar al paciente y medicamentos para prevenir las náuseas y el vómito.

Día 1ro del ciclo:

- 🕒 **Ciclofosfamida y vincristina:** a través de las venas, por un catéter central.
- 🕒 Puede durar entre 2 y 3 horas.
- 🕒 **Prednisolona:** por la boca con el estómago lleno (después de las comidas).

Días del 2do al 5to:

- 🕒 Prednisolona: por la boca con el estómago lleno (después de las comidas).

*Antes de los ciclos de quimioterapia se deben tomar exámenes de sangre para evaluar el estado del paciente. El médico tratante entregará las órdenes.

Informe a su médico tratante:

- 0 Si usted o su pareja se encuentra en embarazo o está amamantando durante el tratamiento, ya que estos medicamentos pueden interferir con la salud del bebé.
- 0 Los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.

Precauciones

- 0 **Después del primer día de quimioterapia:**
 - Si el paciente se encuentra hospitalizado, se le tomarán exámenes 2 a 3 veces por semana.
 - Si recibe tratamiento ambulatorio: el médico ordenará los exámenes de control, para revisarlos durante la consulta.
- 0 **Estos medicamentos podrían producir infertilidad**, si se encuentra en edad fértil debe realizar valoración con el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología para definir el método anticonceptivo más apropiado. Recuerde consultar con su médico tratante antes del inicio de cualquier medicamento.
- 0 Evite consumir bebidas alcohólicas durante el tratamiento.
- 0 Consuma abundante líquido (8 a 10 vasos al día), para proteger los riñones.
- 0 En ocasiones se requiere **pegfilgrastim**, un medicamento que ayuda a mejorar las defensas. Este se suministra 24 horas después de la infusión de la quimioterapia a través de una inyección subcutánea (debajo de la piel) o bien, el mismo día de la quimioterapia, con un dispositivo denominado OBI, consulte con Enfermería sus cuidados.
- 0 **Informe inmediatamente cualquier sensación de ardor, escozor o dolor en la zona de aplicación del medicamento.**

Efectos secundarios del tratamiento:

- 0 Náuseas y vómito.
- 0 Lesiones en la boca (llagas).
- 0 Caída del pelo y vello corporal.
- 0 Cansancio.
- 0 Disminución de las defensas y las plaquetas: puede generar sangrados.

- o Alteraciones del corazón.
- o Estreñimiento severo
- o Entumecimiento u hormigueo en las extremidades.
- o Reacciones alérgicas: irritación, picazón o enrojecimiento de la piel.
- o Dolor óseo.



Certificado N° 013

fvlcali



fvlty



@FVLCali



@fundacionvalledelili



Fundacion Valle del lili

Sede Limonar: Carrera 70 #18-75

Ext. 7185 Atención 24 horas. www.valledellili.org

