



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Quimioterapia TD:

Plan de tratamiento con talidomida y dexametasona

Ciclos de quimioterapia: es la aplicación de los medicamentos seguido de unos días de descanso.

- 🕒 Por lo general, se suministran entre 6 y 8 ciclos.
- 🕒 Comienzan a contar desde el día en que se suministran los medicamentos por primera vez.
- 🕒 La duración de cada ciclo es de 28 días.
- 🕒 Se realiza de forma ambulatoria.

¿Cómo se suministra?

- 🕒 **Talidomida:** a través de la boca, puede ser durante 21 días, descansando una semana o continuo (28 días sin descanso).
- 🕒 **Dexametasona:** a través de la boca durante 4 días.

*Durante el tratamiento, el médico podrá ordenar exámenes de sangre para evaluar el estado clínico del paciente.

Informe a su médico tratante:

- 🕒 Si usted o su pareja se encuentra en embarazo o está amamantando durante el tratamiento, ya que estos medicamentos pueden interferir con la salud del bebé.
- 🕒 Los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.



Precaución:

Estos medicamentos podrían producir infertilidad, si se encuentra en edad fértil debe realizar valoración con el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología para definir el método anticonceptivo más apropiado. Recuerde consultar con su médico tratante antes del inicio de cualquier medicamento.

Efectos secundarios del tratamiento:

- Náuseas, vómito y diarrea o estreñimiento.
- Lesiones en la boca (llagas).
- Dolor muscular o articular.
- Cansancio.
- Disminución de las defensas y las plaquetas: puede generar sangrados.
- Dificultad para dormir.
- Dolor de cabeza.
- Tos o dificultad para respirar.
- Aumento del apetito.
- Alteraciones en la piel: picazón y enrojecimiento en zonas como el tronco, la espalda, los brazos y las piernas.
- Entumecimiento, hormigueo y dolor en los pies o las manos.
- Hinchazón de las piernas, los brazos o la cara.
- Riesgo de producir trombos.
- Disfunción eréctil.
- Efecto sedante: somnolencia, debilidad, confusión, cambio de humor.

Si presenta síntomas o cambios que no estén descritos anteriormente, informe a su médico en la consulta. Si algún síntoma es severo comuníquese con Enfermería de educación oncológica. Si tiene síntomas graves que necesitan atención inmediata, consulte a urgencias.



Síguenos en:



fvcali



fvltv



@FVLCali



@fundacionvalledelili



Fundacion Valle del lili

Av. Simón Bolívar Cra 98 # 18-49 PBX (57)(2) 331 90 90

Av. Estación: Calle 23 DN #4N-21.

Sede Limonar: Carrera 70 #18-75

Ext. 7185 Atención 24 horas. www.valledelili.org