

Quimioterapia VRD:

Plan de tratamiento con bortezomib, lenalidomida y dexametasona

Ciclos de quimioterapia: es la aplicación de los medicamentos seguido de unos días de descanso.

- 0 Por lo general, se suministran de 8 ciclos de quimioterapia.
- 0 Comienzan a contar desde el día en que se suministran los medicamentos por primera vez.
- 0 La duración de cada ciclo es de 21 o 28 días.
- 0 Se puede administrar de forma intrahospitalaria o en la sala de quimioterapia ambulatoria.

¿Cómo se suministra?

- 0 **Bortezomib y dexametasona:** semanalmente o dos veces por semana, según indicación médica.
- 0 **Bortezomib:** se inyecta debajo de la piel (vía subcutánea): en los muslos o el abdomen.
- 0 **Dexametasona:** a través de las venas o por la boca.
- 0 **Lenalidomida:** por la boca, durante 14 días.

*Previo a los ciclos de quimioterapia se deben tomar exámenes de sangre para evaluar el estado del paciente. El médico tratante entregará las órdenes.

Informe a su médico tratante:

- 0 Si usted o su pareja se encuentra en embarazo o está amamantando durante el tratamiento, ya que estos medicamentos pueden interferir con la salud del bebé.
- 0 Los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.

Precauciones

- 0 **Estos medicamentos podrían producir infertilidad**, si se encuentra en edad fértil debe realizar valoración con el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología para definir el método anticonceptivo más apropiado. Recuerde consultar con su médico tratante antes del inicio de cualquier medicamento.
- 0 Consuma abundantes líquidos orales (8 a 10 vasos día): antes, durante y después de la aplicación del tratamiento.
- 0 Evite consumir bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

Efectos secundarios del tratamiento:

- 0 Náuseas, vómito y diarrea o estreñimiento.
- 0 Lesiones en la boca (llagas).
- 0 Ansiedad y alteraciones del sueño.
- 0 Alteraciones en la piel: irritación, resequedad y picazón.
- 0 Dolor muscular o articular.
- 0 Cansancio.
- 0 Disminución de las defensas y plaquetas: puede generar sangrados.
- 0 Dolor de cabeza.
- 0 Tos o dificultad para respirar.
- 0 Aumento del apetito.
- 0 Entumecimiento, hormigueo y dolor en los pies o las manos.

Si presenta síntomas o cambios que no estén descritos anteriormente, informe a su médico en la consulta. Si algún síntoma es severo comuníquese con Enfermería de educación oncológica. Si tiene síntomas graves que necesitan atención inmediata, consulte a urgencias.



Síguenos en:



fvcali



fvltv



@FVLCali



@fundacionvalledelili



Fundacion Valle del lili

Av. Simón Bolívar Cra 98 # 18-49 PBX (57)(2) 331 90 90

Av. Estación: Calle 23 DN #4N-21.

Sede Limonar: Carrera 70 #18-75

Ext. 7185 Atención 24 horas. www.valledellili.org