

## Quimioterapia VTD:

### Plan de tratamiento con bortezomib, talidomida y dexametasona

**Ciclos de quimioterapia:** es la aplicación de los medicamentos seguido de unos días de descanso.

- 0 Por lo general, se suministran entre 6 y 8 ciclos de quimioterapia.
- 0 Comienzan a contar desde el día en que se suministran los medicamentos por primera vez.
- 0 La duración de cada ciclo es de 28 días.
- 0 Se puede administrar de forma intrahospitalaria o en la sala de quimioterapia ambulatoria.

### ¿Cómo se suministra?

- 0 **Bortezomib y dexametasona:** se aplican semanalmente.
- 0 **Bortezomib:** se inyecta debajo de la piel (vía subcutánea) en los muslos o el abdomen.
- 0 **Dexametasona:** a través de las venas.
- 0 **Talidomida:** por la boca, durante 21 días.

\*Previo a los ciclos de quimioterapia se deben tomar exámenes de sangre para evaluar el estado del paciente. El médico tratante entregará las órdenes.

### Informe a su médico tratante:

- 0 Si usted o su pareja se encuentra en embarazo o está amamantando durante el tratamiento, ya que estos medicamentos pueden interferir con la salud del bebé.
- 0 Los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.

## Precaución:

**Estos medicamentos podrían producir infertilidad**, si se encuentra en edad fértil debe realizar valoración con el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología para definir el método anticonceptivo más apropiado. Recuerde consultar con su médico tratante antes del inicio de cualquier medicamento.

## Efectos secundarios del tratamiento:

- ⦿ Náuseas, vómito y diarrea o estreñimiento.
- ⦿ Lesiones en la boca (llagas).
- ⦿ Ansiedad y alteraciones del sueño.
- ⦿ Alteraciones en la piel: irritación, resequedad y picazón.
- ⦿ Dolor muscular o articular.
- ⦿ Cansancio.
- ⦿ Disminución de las defensas y plaquetas: puede generar sangrados.
- ⦿ Dolor de cabeza.
- ⦿ Tos o dificultad para respirar.
- ⦿ Aumento del apetito.
- ⦿ Alteraciones de la piel: picazón y enrojecimiento.
- ⦿ Somnolencia, debilidad, confusión, cambio de humor.
- ⦿ Entumecimiento, hormigueo y dolor en los pies o las manos.

**Si presenta síntomas o cambios que no estén descritos anteriormente, informe a su médico en la consulta. Si algún síntoma es severo comuníquese con Enfermería de educación oncológica. Si tiene síntomas graves que necesitan atención inmediata, consulte a urgencias.**



### Síguenos en:



fvcali



fvltv



@FVLCali



@fundacionvalledelili



Fundacion Valle del lili

Av. Simón Bolívar Cra 98 # 18-49 PBX (57)(2) 331 90 90

Av. Estación: Calle 23 DN #4N-21.

Sede Limonar: Carrera 70 #18-75

Ext. 7185 Atención 24 horas. [www.valledellili.org](http://www.valledellili.org)