



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

ANASTROZOLE - TABLETAS

¿Para qué sirve el medicamento?

Tratamiento de cáncer de seno. Sólo funciona en mujeres posmenopáusicas y que producen estrógenos fuera del ovario.

Antes de tomar el medicamento informe a su médico si presenta:

- ⦿ Antecedentes de eventos cardiovasculares.
- ⦿ Colesterol elevado.
- ⦿ Alergias.
- ⦿ Intolerancia a la lactosa.

Si requiere atención médica por cualquier motivo diferente a la enfermedad oncológica, informe al personal de salud que le atiende.

Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- ⦿ Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología.
- ⦿ Restrinja la lactancia materna mientras utiliza este medicamento.

¿Cómo almacenar el medicamento?

- ⦿ Guarde el medicamento en su empaque original.
- ⦿ Almacene en un lugar seco y fresco, lejos del calor y la luz solar (no en el baño).
- ⦿ Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños y mascotas.
- ⦿ No deseche ningún medicamento en su casa. Llévelos a la farmacia para deshacerse de ellos de manera segura.

Manipulación segura del medicamento:

El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- 0 Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: Lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- 0 Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- 0 Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

IMPORTANTE:

- 0 Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe al médico.
- 0 Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.

¿Cómo tomar el medicamento?

- 0 Siga las instrucciones del médico tratante sobre horario y dosis.
- 0 Puede tomarse con o sin alimentos, siempre a la misma hora.
- 0 La tableta debe tomarse entera. No la triture, parta o mastique.
- 0 Si olvida una dosis, tómela si está dentro de las 12 horas siguientes, de lo contrario, omita y tome su próxima dosis según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada.
- 0 Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o personal de Enfermería la forma de dilución y administración del medicamento.

Efectos secundarios del medicamento:

- ⦿ Náuseas, vómito, diarrea o estreñimiento.
- ⦿ Presión arterial alta.
- ⦿ Cansancio.
- ⦿ Dolor muscular, articular, de los huesos o de cabeza.
- ⦿ Inflamación de las extremidades.
- ⦿ Caída del pelo y vello corporal.
- ⦿ Tos.
- ⦿ Cambios en la orina.
- ⦿ Sudoración.
- ⦿ Cambios de estado de ánimo.
- ⦿ Dolor o irritación en la garganta.
- ⦿ Lesiones en la piel.
- ⦿ Mareo.
- ⦿ Resequedad en la boca.
- ⦿ Inflamación, secreciones, picazón y dolor en la vagina.
- ⦿ Flujo vaginal.

Si experimenta algún efecto secundario mientras recibe la medicación, consulte de forma inmediata a su médico para asesorarlo adecuadamente. Evite remedios caseros o auto medicarse.



www.valledellili.org

Programa educativo al paciente oncológico y su familia

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185