



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

AXITINIB - TABLETAS

¿Para qué sirve el medicamento?

Tratamiento para el cáncer de riñón.

Antes de tomar el medicamento informe a su médico si presenta:

- 0 Tiroides hipoactiva.
- 0 Alteraciones cardiovasculares.
- 0 Alergias.
- 0 Intolerancia a la lactosa.



Si requiere atención médica por cualquier motivo diferente a la enfermedad oncológica, informe al personal de salud que le atiende.

Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- 0 Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología.
- 0 Informe a su equipo de atención médica si usted o su pareja está embarazada, queda embarazada durante el tratamiento o si está amamantando. El uso de este medicamento podría causar daño al bebé.
- 0 Restrinja la lactancia materna mientras utiliza este medicamento.
- 0 Este medicamento puede producir infertilidad.

¿Cómo almacenar el medicamento?

- 0 Guarde el medicamento en su empaque original.
- 0 Almacene en un lugar seco y fresco, lejos del calor y la luz solar.
- 0 Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños y mascotas.
- 0 No deseche ningún medicamento en su casa. Llévelos a la farmacia para deshacerse de ellos de manera segura.



Manipulación segura del medicamento:

El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- 0 Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: Lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- 0 Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- 0 Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

IMPORTANTE:

- 0 Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe al médico.
- 0 Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.

¿Cómo tomar el medicamento?

- 0 Siga las instrucciones del médico tratante sobre horario y dosis.
- 0 Puede tomarse con o sin alimentos, con un vaso de agua.
- 0 Puede necesitar tabletas de diferentes concentraciones para obtener la dosis completa. Por esta razón, asegúrese de identificar las tabletas adecuadamente para obtener la dosis correcta.
- 0 Si olvida una dosis, omítala y tome su próxima dosis según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada. Si vomita la dosis, no la reemplace, informe a su médico.
- 0 Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o personal de Enfermería la forma de dilución y administración del medicamento.



Efectos secundarios del medicamento:

- ⦿ Dolor, adelgazamiento, engrosamiento o enrojecimiento de palmas o pies, incluyendo hormigueo, entumecimiento, descamación, ampollas o grietas en la piel.
- ⦿ Presión arterial alta.
- ⦿ Dolor de cabeza severo.
- ⦿ Confusión o convulsiones.
- ⦿ Cansancio.
- ⦿ Alteraciones en la voz.
- ⦿ Lesiones en la boca.
- ⦿ Pérdida del apetito y de peso.
- ⦿ Náuseas y vómito.
- ⦿ Caída del pelo y vello corporal.
- ⦿ Diarrea o estreñimiento.
- ⦿ Espasmos musculares, debilidad o calambres severos.
- ⦿ Dolor lumbar, hinchazón inusual del cuerpo, orinar poco o nada.
- ⦿ Sangrados (en deposiciones, tos, orina, piel) o moretones inusuales.

Si experimenta algún efecto secundario mientras recibe la medicación, consulte de forma inmediata a su médico para asesorarlo adecuadamente. Evite remedios caseros o auto medicarse.



www.valledellili.org

Programa educativo al paciente oncológico y su familia

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185