



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

DABRAFENIB - CÁPSULAS

¿Para qué sirve el medicamento?

Tratamiento, en algunos casos, de melanoma y cáncer de pulmón.

Antes de tomar el medicamento, informe a su médico si presenta:

- ⦿ Alteraciones cardíacas o creatinina elevada.
- ⦿ Alergias.

Si requiere atención médica por cualquier motivo diferente a la enfermedad oncológica, informe al personal de salud que le atiende.

Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- ⦿ Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología.
- ⦿ Informe a su equipo de atención médica si usted o su pareja está embarazada, queda embarazada durante el tratamiento o si está amamantando. El uso de este medicamento podría causar daño al bebé.
- ⦿ Restrinja la lactancia materna mientras utiliza este medicamento.
- ⦿ Este medicamento puede producir infertilidad.

¿Cómo almacenar el medicamento?

- ⦿ Guarde el medicamento en su empaque original.
- ⦿ Almacene en un lugar seco y fresco, lejos del calor y la luz solar.
- ⦿ Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños y mascotas.
- ⦿ No deseche ningún medicamento en su casa. Llévelos a la farmacia para deshacerse de ellos de manera segura.



Manipulación segura del medicamento:

El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- 0 Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: Lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- 0 Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- 0 Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

IMPORTANTE:

- 0 Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe al médico.
- 0 Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.

¿Cómo tomar el medicamento?

- 0 Siga las instrucciones del médico tratante sobre horario y dosis.
 - 0 Debe tomarse siempre a la misma hora, al menos 2 horas antes o después de una comida.
 - 0 Si olvida una dosis, tómela si está dentro de las 6 horas siguientes, de lo contrario, omita y tome su próxima dosis según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada.
 - 0 Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o personal de Enfermería la forma de dilución y administración del medicamento.
- 

Efectos secundarios del medicamento:

- ⦿ Anemia y disminución de células de defensa.
- ⦿ Diarrea o estreñimiento, náuseas y vómito.
- ⦿ Cansancio .
- ⦿ Dolor muscular, en las extremidades y articulaciones.
- ⦿ Dolor abdominal , de cabeza y garganta.
- ⦿ Piel seca.
- ⦿ Orina turbia o de mal olor.
- ⦿ Hormigueo, enrojecimiento, adormecimiento, dolor o inflamación en las palmas de las manos y plantas de los pies.
- ⦿ Caída del pelo y vello corporal.
- ⦿ Fiebre.
- ⦿ Tos.
- ⦿ Sangrados: en la orina, deposición, encías, entre otros.
- ⦿ Dificultad para dormir.
- ⦿ Sudores nocturnos.
- ⦿ Mareos.

Si experimenta algún efecto secundario mientras recibe la medicación, consulte de forma inmediata a su médico para asesorarlo adecuadamente. Evite remedios caseros o auto medicarse.



www.valledellili.org

Programa educativo al paciente oncológico y su familia

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185