



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

DEXAMETASONA - TABLETAS

¿Para qué sirve el medicamento?

Tratamiento de leucemia, linfoma, tumores cerebrales y edemas relacionados, náuseas y vómito generado por la quimioterapia y reacciones de hipersensibilidad.

Antes de tomar el medicamento informe a su médico si presenta:

- ⦿ Cirrosis.
- ⦿ Alteraciones cardiovasculares:
Hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, formación de trombos.
- ⦿ Diabetes.
- ⦿ Glaucoma o cataratas.
- ⦿ Tuberculosis.
- ⦿ Infecciones previas.
- ⦿ Alergias.

Si requiere atención médica por cualquier motivo diferente a la enfermedad oncológica, informe al personal de salud que le atiende.

Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- ⦿ Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología.
- ⦿ Informe a su equipo de atención médica si usted o su pareja está embarazada, queda embarazada durante el tratamiento o si está amamantando. El uso de este medicamento podría causar daño al bebé.
- ⦿ Restrinja la lactancia materna mientras utiliza este medicamento.

¿Cómo almacenar el medicamento?

- 0 Guarde el medicamento en su empaque original.
- 0 Almacene en un lugar seco y fresco, lejos del calor y la luz solar (no en el baño).
- 0 Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños y mascotas.

Manipulación segura del medicamento:

El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- 0 Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: Lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- 0 Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- 0 Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

IMPORTANTE:

- 0 Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe al médico.
- 0 Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.

¿Cómo tomar el medicamento?

- 0 Siga las instrucciones del médico tratante sobre horario y dosis.
- 0 Puede tomarse con alimentos, siempre a la misma hora.
- 0 La tableta debe tomarse entera. No la triture, parta o mastique.

- 0 Si olvida una dosis, tómela si está dentro de las 12 horas siguientes, de lo contrario, omita y tome su próxima dosis según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada.
- 0 Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o personal de Enfermería la forma de dilución y administración del medicamento.
- 0 No suspenda este medicamento sin orden médica. Después de un uso prolongado, su dosis de dexametasona se reducirá muy lentamente antes de detenerse.

Efectos secundarios del medicamento:

- 0 Acidez estomacal e indigestión.
- 0 Inflamación de las extremidades.
- 0 Insomnio o depresión.
- 0 Aumento de apetito y de peso.
- 0 Presión arterial alta.
- 0 Debilidad muscular .
- 0 Infección.
- 0 Delirios, alucinaciones, hablar de forma incoherente y nerviosismo.
- 0 Pérdida de masa muscular.

Si experimenta algún efecto secundario mientras recibe la medicación, consulte de forma inmediata a su médico para asesorarlo adecuadamente. Evite remedios caseros o auto medicarse.



www.valledellili.org

Programa educativo al paciente oncológico y su familia

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185