



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

IMATINIB - TABLETAS

¿Para qué sirve el medicamento?

Tratamiento de un tipo de leucemia mieloide crónica o leucemia linfoblástica aguda con cromosoma filadelfio positivo o Ph. También se puede usar en tumores estromales gastrointestinales (GIST) y sarcomas de tejidos blandos.

Antes de tomar el medicamento informe a su médico si:

- ❶ Tiene o tuvo enfermedades cardíacas, hepáticas, renales, problemas de sangrados, alteraciones en la tiroides o alguna alergia.
- ❷ Toma algún medicamento adicional: suplementos, vitaminas, medicinas homeopáticas o de origen natural, ya que este puede interactuar con otros medicamentos y provocar que el tratamiento no funcione bien o cause efectos secundarios graves.

Si requiere atención médica por cualquier motivo diferente a la enfermedad oncológica, informe al personal de salud que le atiende.

Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- ❶ Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología.
- ❷ Informe a su equipo de atención médica si usted o su pareja está embarazada, queda embarazada durante el tratamiento o si está amamantando. El uso de este medicamento podría causar daño al bebé.
- ❸ Restrinja la lactancia materna mientras utiliza este medicamento.

¿Cómo almacenar el medicamento?

- ❶ Guarde el medicamento en su empaque original.
- ❷ Almacene en un lugar seco y fresco, lejos del calor y la luz solar (no en el baño).
- ❸ Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños y mascotas.

Manipulación segura del medicamento:

El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: Lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

IMPORTANTE:

- Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe al médico.
- Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.

¿Cómo tomar el medicamento?

- Siga las instrucciones del médico tratante sobre horario y dosis.
- Debe tomarse con alimentos, sin triturar ni masticar, siempre a la misma hora.
- Si no puede tragar la tableta:
 - * De 400 mg: disolver en 200 ml de agua o jugo de manzana.
 - * De 100 mg: disolver en 50 ml de agua o jugo de manzana.
- Beba el contenido de inmediato. Luego, enjuague el vaso con agua o jugo de manzana y beba nuevamente para evitar desperdiciar medicamento.

- 0 Si olvida una dosis, omítala y tome su próxima dosis según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada. Si vomita la dosis, no la reemplace, informe a su médico.
- 0 Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o personal de Enfermería la forma de dilución y administración del medicamento.
- 0 Evite frutas como: toronja y carambola, estas pueden aumentar los efectos secundarios.

Efectos secundarios del medicamento:

- 0 Retención de líquidos: aumento de peso, hinchazón, dificultad para respirar.
- 0 Dolor en el cuerpo.
- 0 Náuseas, vómito o diarrea.
- 0 Alteraciones en la piel.
- 0 Cansancio.
- 0 Dolor abdominal.
- 0 Dolor de cabeza.
- 0 Infección y sangrados.

Si experimenta algún efecto secundario mientras recibe la medicación, consulte de forma inmediata a su médico para asesorarlo adecuadamente. Evite remedios caseros o auto medicarse.



Certificado N° 015



www.valledellili.org

Programa educativo al paciente oncológico y su familia

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185