



FUNDACIÓN  
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

## PONATINIB - PASTILLAS

### ¿Para qué sirve el medicamento?

Tratamiento de varios tipos de cáncer en la sangre: leucemia mieloide crónica o leucemia linfoblástica aguda.

### Antes de tomar el medicamento informe a su médico si:

- ⦿ Tiene o tuvo enfermedades cardíacas, hepáticas, del páncreas, enfermedad arterial periférica, intolerancia a la lactosa o si tiene alguna alergia.
- ⦿ Toma algún medicamento adicional, suplementos, vitaminas, medicinas homeopáticas o de origen natural, ya que pueden interactuar con el tratamiento y provocar efectos secundarios graves.

*Si requiere atención médica por cualquier motivo diferente a la enfermedad oncológica, informe al personal de salud que le atiende.*

*En caso de cirugía, suspenda el ponatinib 7 días antes. No lo reinicie hasta que la herida esté completamente sana.*

### Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- ⦿ Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología.
- ⦿ Informe a su equipo de atención médica si usted o su pareja está embarazada, queda embarazada durante el tratamiento (o los 45 días posteriores a la última dosis) o si está amamantando. El uso de este medicamento podría causar daño al bebé.
- ⦿ Restrinja la lactancia materna mientras utiliza este medicamento.

### ¿Cómo almacenar el medicamento?

- ⦿ Guarde el medicamento en su empaque original.
- ⦿ Almacene en un lugar seco y fresco, lejos del calor y la luz solar.
- ⦿ Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños y mascotas.

## Manipulación segura del medicamento:

### El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

### El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: Lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

## IMPORTANTE:

- Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe al médico.
- Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.

## ¿Cómo tomar el medicamento?

- Siga las instrucciones del médico tratante sobre horario y dosis.
- Puede tomarse con o sin alimentos, sin triturar, diluir o masticar, preferiblemente, siempre a la misma hora.
- Si olvida una dosis, omítala y tome su próxima dosis según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada. Si vomita la dosis, no la reemplace, informe a su médico.
- Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o personal de Enfermería la forma de dilución y administración del medicamento.
- Evite frutas como: toronja y carambola, estas pueden aumentar los efectos secundarios.
- No consuma alcohol ni fume durante el tratamiento. Consulte con su médico.



## Efectos secundarios del medicamento:

- ⦿ Infección.
- ⦿ Sangrado.
- ⦿ Alteraciones en la piel: irritación, sequedad y picazón.
- ⦿ Lesiones en la boca o garganta.
- ⦿ Trombosis.
- ⦿ Dolor abdominal.
- ⦿ Dolor de cabeza.
- ⦿ Estreñimiento.
- ⦿ Cansancio.
- ⦿ Dolor en los huesos y las articulaciones.
- ⦿ Náuseas, vómito.
- ⦿ Hinchazón en los brazos y piernas.
- ⦿ Hipertensión.

***Si experimenta algún efecto secundario mientras recibe la medicación, consulte de forma inmediata a su médico para asesorarlo adecuadamente. Evite remedios caseros o auto medicarse.***



Certificado N° 015



[www.valledellili.org](http://www.valledellili.org)

***Programa educativo al paciente oncológico y su familia***

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185