



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

DASATINIB - TABLETAS

¿Para qué sirve el medicamento?

Tratamiento de leucemia mieloide crónica y de leucemia linfoblástica aguda con cromosoma filadelfio positivo o Ph.

Antes de tomar el medicamento informe a su médico si:

- 0 Tiene o tuvo enfermedades del corazón, hígado, alguna alergia o intolerancia a la lactosa.
- 0 Toma algún medicamento adicional, suplementos, vitaminas, medicinas homeopáticas o de origen natural; estos pueden interactuar con el tratamiento y provocar efectos secundarios graves.
- 0 Tiene algún procedimiento odontológico o cirugía pendiente.

Si requiere atención médica por cualquier motivo diferente a la enfermedad oncológica, informe al personal de salud que le atiende.

Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- 0 Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología.
- 0 Informe a su equipo de atención médica si usted o su pareja está embarazada, queda embarazada durante el tratamiento o si está amamantando. El uso de este medicamento podría causar daño al bebé.
- 0 Restrinja la lactancia materna mientras utiliza este medicamento.

¿Cómo almacenar el medicamento?

- 0 Guarde el medicamento en su empaque original.
- 0 Almacene en un lugar seco y fresco, lejos del calor y la luz solar.
- 0 Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños y mascotas.

Manipulación segura del medicamento:

El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- ❶ Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: Lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- ❷ Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- ❸ Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

IMPORTANTE:

- ❶ Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe al médico.
- ❷ Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.

¿Cómo tomar el medicamento?

- ❶ Siga las instrucciones del médico tratante sobre horario y dosis.
- ❷ Puede tomarse con o sin alimentos, con un vaso de agua, sin triturar o masticar y siempre a la misma hora.
- ❸ Olvidar dosis pone en riesgo la efectividad del tratamiento. Si ocurre, omítala y tome su próxima dosis según lo programado. No la duplique para. Si la vomita, no la reemplace, informe a su médico.
- ❹ Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o personal de Enfermería la forma de dilución y administración del medicamento.
- ❺ Evite frutas como: toronja y carambola, estas pueden aumentar los efectos secundarios.
- ❻ Evite medicamentos antiácidos (ej: hidróxido de aluminio). Si es necesario, tómelo 2 horas antes o 2 horas después del dasatinib.

Efectos secundarios del medicamento:

- ⦿ Anemia, sangrados, moretones.
- ⦿ Infecciones.
- ⦿ Dificultad para respirar.
- ⦿ Retención de líquidos: hinchazón, aumento de peso.
- ⦿ Diarrea, náuseas, vómito.
- ⦿ Dolor de cabeza y el cuerpo.
- ⦿ Piel seca y con picazón.
- ⦿ Hormigueo y entumecimiento de dedos de manos y pies.
- ⦿ Alteraciones del corazón.

Si experimenta algún efecto secundario mientras recibe la medicación, consulte de forma inmediata a su médico para asesorarlo adecuadamente. Evite remedios caseros o auto medicarse.



www.valledellili.org

Programa educativo al paciente oncológico y su familia

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185