



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

METOTREXATO - TABLETAS

¿Para qué sirve el medicamento?

Tratamiento de varios tipos de cáncer: leucemia linfoblástica aguda, linfoma de Burkitt, linfoma cutáneo de células T (micosis fungoide), osteosarcomas, entre otros.

Antes de tomar el medicamento informe a su médico si:

- ❑ Tiene o tuvo enfermedades hepáticas, renales o si tiene alguna alergia.
- ❑ Toma algún medicamento adicional, suplementos, vitaminas, medicinas homeopáticas o de origen natural, ya que este puede interactuar con el tratamiento y provocar efectos secundarios graves.
- ❑ Tiene algún procedimiento odontológico o cirugía pendiente.

Si requiere atención médica por cualquier motivo diferente a la enfermedad oncológica, informe al personal de salud que le atiende.

Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- ❑ Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología.
- ❑ Informe a su equipo de atención médica si usted o su pareja está embarazada, queda embarazada durante el tratamiento o si está amamantando. El uso de este medicamento podría causar daño al bebé.
- ❑ Restrinja la lactancia materna mientras utiliza este medicamento.

¿Cómo almacenar el medicamento?

- ❑ Guarde el medicamento en su empaque original.
- ❑ Almacene en un lugar seco y fresco, lejos del calor y la luz solar (no en el baño).
- ❑ Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños y mascotas.

Manipulación segura del medicamento:

El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- ❶ Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: Lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- ❷ Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- ❸ Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

IMPORTANTE:

- ❶ Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe al médico.
- ❷ Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.

¿Cómo tomar el medicamento?

- ❶ Siga las instrucciones del médico tratante sobre horario y dosis.
- ❷ Debe tomarse siempre a la misma hora, con el estómago vacío: al menos 1 hora antes o 2 horas después de la comida u otros medicamentos. Evite tomarlo con productos lácteos, ya que esto disminuye a efectividad del medicamento.
- ❸ La tableta debe tomarse entera. No la triture, parta o mastique.
- ❹ Olvidar las dosis pone en riesgo la efectividad del tratamiento. Si esto ocurre, omítala y tome la próxima según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada.

- Ø Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o personal de Enfermería la forma de dilución y administración del medicamento.
- Ø No consuma alcohol ni fume durante el tratamiento. Consulte con su médico.

Efectos secundarios del medicamento:

- Ø Sangrados.
- Ø Fiebre.
- Ø Infecciones.
- Ø Dolor de cabeza.
- Ø Complicaciones pulmonares.
- Ø Pérdida de apetito
- Ø Náuseas, vómito y dolor abdominal.
- Ø Diarrea.
- Ø Llagas en la boca y la garganta.
- Ø Irritación o resequedad en la piel
- Ø Este medicamento puede producir mareos, visión borrosa, cansancio excesivo o somnolencia, por lo que se recomienda no conducir

Si experimenta algún efecto secundario mientras recibe la medicación, consulte de forma inmediata a su médico para asesorarlo adecuadamente. Evite remedios caseros o auto medicarse.



www.valledellili.org

Programa educativo al paciente oncológico y su familia

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185