

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

OSIMERTINIB- TABLETAS

¿Para qué sirve el medicamento?

Tratamiento para algunos cáncer de pulmón

Antes de tomar el medicamento informe a su médico si presenta:

- ⦿ Problemas cardíacos.
- ⦿ Problemas de hígado, riñón o pulmón.
- ⦿ Alergias.

Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- ⦿ Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de salud sexual y reproductiva o con el ginecólogo.
- ⦿ Este medicamento puede afectar la fertilidad (capacidad de quedar embarazada).
- ⦿ El uso de este medicamento en hombres o mujeres puede causar daño al bebé. Informe a su equipo de atención médica si usted o su pareja está embarazada o si queda embarazada durante el tratamiento.
- ⦿ Si existe alguna posibilidad de que usted o su pareja puedan quedar en embarazo se debe:
 - Usar 2 métodos anticonceptivos efectivos al mismo tiempo mientras toma este medicamento.
 - Este medicamento puede reducir la efectividad de las píldoras anticonceptivas basadas en hormonas. Use otro método anticonceptivo.
 - Siga usando métodos anticonceptivos durante al menos 2 meses después de su última dosis (si es mujer) o 4 meses después de la última dosis (si es hombre).
- ⦿ No amamante mientras usa este medicamento.



Otras recomendaciones:

- 
- Guarde el medicamento en su empaque original.
 - Almacene en un lugar seco, a temperatura ambiente (15-30 °C), lejos del calor y la luz.
 - Mantenga fuera de la vista y del alcance de los niños y mascotas.
 - No arroje ningún medicamento sin usar en su casa. Llévelos a su farmacia para desecharlos de manera segura. Guarde el medicamento en su empaque original.
 - Almacenar en el empaque original para proteger de la humedad, a temperatura ambiente lejos del calor y la luz. No debe guardarse en pastillero
 - Mantenga fuera de la vista y del alcance de los niños y mascotas.
 - No arroje ningún medicamento sin usar en su casa. Llévelos a su farmacia para desecharlos de manera segura.

Manipulación segura del medicamento:

El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: Lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
 - Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
 - Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.
- 



IMPORTANTE:

- 
- ❶ Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe al médico.
 - ❷ Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.

¿Cómo tomar el medicamento?

- ❶ El tiempo y la dosis del medicamento lo define su médico tratante.
 - ❷ Puede tomarse con o sin alimentos a la misma hora todos los días
 - ❸ La tableta debe tomarse entera con agua. No triturar, partir o masticar.
 - ❹ Si olvida una dosis, tómela si está dentro de las 12 horas de la dosis omitida, de lo contrario, omita y tome su próxima dosis según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada.
 - ❺ Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o enfermera la forma de dilución y administración.
 - ❻ No se recomienda consumir jugo de naranja.
 - ❼ Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos y puede provocar que el tratamiento no funcione bien. Estos medicamentos son rosuvastatina, fenitoína, rifampicina, dexametasona, carbamazepina, fenobarbital, ciclosporina, fentanilo, tacrolimus, amiodarona, amitriptilina, sunitinib, metadona, cloroquina, claritromicina, haloperidol, fluconazol, moxifloxacina, domperidona y ondansetrón.
 - ❽ Comente con su médico los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.
- 

Efectos secundarios del medicamento:

- Ø Diarrea, náuseas y vomito
- Ø Fatiga (cansancio)
- Ø Dolor muscular, hormigueo o irritación de la piel, calambres
- Ø Tos, dificultad para respirar
- Ø Cambios en las uñas, erupción cutánea (picazón en la piel seca)
- Ø Estreñimiento
- Ø Sangrado nasal
- Ø Dolor de cabeza
- Ø Falta de apetito, lesiones en la boca

Si presenta alguno de los efectos secundarios descritos, informe a su médico tratante.



www.valledellili.org

Programa educativo al paciente oncológico y su familia

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185

