

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

PAZOPANIB - TABLETAS

¿Para qué sirve el medicamento?

Cáncer de riñón o tejido blando, sarcoma de tejidos blandos.

Antes de tomar el medicamento informe a su médico si presenta:

- ⦿ Enfermedad cardíaca o problemas del ritmo cardíaco.
- ⦿ Presión arterial alta, sangrado o coágulos sanguíneos.
- ⦿ Problemas con su tiroides o hígado.
- ⦿ Diabetes.
- ⦿ Cualquier cirugía reciente o planeada.
- ⦿ Alergias.

Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- ⦿ Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de salud sexual y reproductiva o con el ginecólogo.
- ⦿ El uso de este medicamento en hombres o mujeres puede causar daño al bebé. Informe a su equipo de atención médica si usted está embarazada, queda embarazada durante el tratamiento o si está amamantando.
- ⦿ Si existe alguna posibilidad de que usted o su pareja puedan quedar en embarazo:
 - Use 2 métodos anticonceptivos efectivos al mismo tiempo.
 - Siga usando métodos anticonceptivos hasta 8 semanas después de que finalice el tratamiento (para mujeres) y hasta 2 semanas después de que finalice el tratamiento (para hombres) se recomienda en especial el uso del condón.
- ⦿ No amamante mientras usa este medicamento.
- ⦿ Este medicamento puede afectar la fertilidad (capacidad de quedar embarazada).

¿Cómo almacenar el medicamento?

- 0 Guarde el medicamento en su empaque original.
- 0 Almacene en un lugar seco, no almacenar en un baño, a temperatura ambiente, lejos del calor y la luz.
- 0 Mantenga fuera de la vista y del alcance de los niños y mascotas.
- 0 No deseche ningún medicamento sin usar en su casa. Llévelos a su farmacia para desecharlos de manera segura.

Manipulación segura del medicamento:

El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- 0 Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- 0 Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- 0 Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

IMPORTANTE:

- 0 Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe a su médico.
- 0 Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.



¿Cómo tomar el medicamento?

- 
- ❶ Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o enfermera la forma de dilución y administración.
 - ❷ El tiempo y la dosis del medicamento lo define su médico tratante.
 - ❸ Este medicamento generalmente se toma una vez al día por vía oral.
 - ❹ No corte, triture ni mastique las tabletas, ya que esto puede aumentar los efectos secundarios.
 - ❺ Tome todo el medicamento con un vaso de agua con el estómago vacío, al menos una hora antes o dos horas después de la comida u otros medicamentos. No tome con las comidas ya que eso puede aumentar el riesgo de efectos secundarios.
 - ❻ Si omite una dosis, tómela solo si quedan más de 12 horas hasta la próxima dosis. De lo contrario, omita esto y tome la siguiente dosis según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada.
 - ❼ No coma ni beba toronja, carambola, (o productos que los contengan) mientras esté en este tratamiento.
 - ❽ Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos como esomeprazol, ketoconazol, rifampicina, claritromicina, ritonavir, midazolam, irinotecán, rosuvastatina, dextrometorfano, paclitaxel, dexametasona, warfarina, haloperidol, eritromicina, granisetron, amitriptilina, quinidina y puede provocar que el tratamiento no funcione bien o cause efectos secundarios graves.
 - ❾ Comente con su médico los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.
 - ❿ Beber alcohol y fumar durante su tratamiento puede aumentar algunos efectos secundarios y hacer que su medicamento sea menos efectivo.
- 

Efectos secundarios del medicamento:

- Ø Diarrea, náuseas y vómitos.
- Ø Presión arterial alta.
- Ø Cambios en el color del cabello o la piel (generalmente aclarado).
- Ø Dolor de cabeza; dolor leve en las articulaciones, músculos o calambres.
- Ø Poco apetito.
- Ø Tos.
- Ø Fatiga (cansancio).
- Ø Sangrado o hematomas inusuales (deposición con sangre, tos con sangre, sangre en la orina, puntos morados o rojos en la piel o sangrado que no se detenga)
- Ø Dolores o calambres en el vientre.

Si presenta alguno de los efectos secundarios descritos, informe a su médico tratante.



www.valledellili.org

Programa educativo al paciente oncológico y su familia

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185

