

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

SORAFENIB - TABLETAS

¿Para qué sirve el medicamento?

Cáncer renal, cáncer hepático, cáncer de tiroides.

Antes de tomar el medicamento informe a su médico si presenta:

- 0 Si usted sufre de afecciones cardíacas, enfermedad coronaria o hipertensión arterial no controlada.
- 0 Si planea someterse a una cirugía mayor (por ejemplo, reemplazo de una articulación), informe a su cirujano que está tomando sorafenib. Es posible que deba dejar de tomar este medicamento al menos 2 semanas antes de la cirugía. Reinícielo solo después de que su médico le indique que sus heridas tienen curado.
- 0 Si usted planea la paternidad o maternidad o si se encuentra amamantando al momento de iniciar el medicamento.

Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- 0 Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de salud sexual y reproductiva o con el ginecólogo.
- 0 El uso de este medicamento en hombres o mujeres puede causar daño al bebé. Informe a su equipo de atención médica si usted o su pareja está embarazada o si queda embarazada durante el tratamiento
- 0 Si existe alguna posibilidad de que usted o su pareja puedan quedar en embarazo:
 - Use 2 métodos anticonceptivos efectivos al mismo tiempo mientras toma este medicamento.
 - Este medicamento puede reducir la efectividad de las píldoras anticonceptivas basadas en hormonas. Use otro método anticonceptivo. Siga usando métodos anticonceptivos durante al menos 6 meses después de su última dosis (si es mujer) o 3 meses después de la última dosis (si es hombre).

- 
- ⦿ No amamante mientras usa este medicamento.
 - ⦿ Este medicamento puede afectar la fertilidad (capacidad de quedar embarazada).



Otras recomendaciones:

- ⦿ Guarde el medicamento en su empaque original.
- ⦿ Almacene en un lugar seco, a temperatura ambiente, lejos del calor y la luz, no almacene en baños
- ⦿ Mantenga fuera de la vista y del alcance de los niños y mascotas.
- ⦿ No arroje ningún medicamento sin usar en su casa. Llévelos a su farmacia para desecharlos de manera segura.

Manipulación segura del medicamento:

El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- ⦿ Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- ⦿ Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- ⦿ Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

IMPORTANTE:

- ⦿ Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe a su médico.
 - ⦿ Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.
- 



¿Cómo tomar el medicamento?

- 🕒 El tiempo y la dosis del medicamento lo define su médico tratante.
- 🕒 Puede tomarse sin alimentos a la misma hora todos los días.
- 🕒 La tableta debe tomarse entera con agua y no triturarse, partirse o masticarse.
- 🕒 Si olvida una dosis, tómela lo antes posible si es dentro de las 6 horas posteriores a la dosis olvidada, Si han pasado más de 6 horas desde su dosis olvidada, omítala y tome su próxima dosis según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada.
- 🕒 Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o enfermera la forma de dilución y administración.
- 🕒 Si vomita la dosis de sorafenib dentro de los 30 minutos de haberlo tomado, repita la dosis.
- 🕒 Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos como la warfarina, ciclofosfamida, ifosfamida, metadona, bupropión, paclitaxel, fenitoína, rifampicina, dexametasona, carbamazepina, fenobarbital, doxorubicina e irinotecan y neomicina pueden provocar que el tratamiento no funcione bien o cause efectos secundarios graves.
- 🕒 Comente con su médico los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.
- 🕒 Beber alcohol y fumar durante su tratamiento puede aumentar algunos efectos secundarios y hacer que su medicamento sea menos efectivo.



Efectos secundarios del medicamento:

- Ø Hormigueos, enrojecimiento, adormecimiento, dolor e inflamación en las palmas y plantas de los pies.
- Ø Resequedad en la piel, pérdida de cabello.
- Ø Diarrea, estreñimiento o náuseas.
- Ø Dolor de cabeza y cansancio.
- Ø Presión arterial alta.
- Ø Dificultad para hablar.
- Ø Orina turbia.
- Ø Sangrados por cualquier parte del cuerpo: orina, deposición negra, encías, aparición de puntos rojos en la piel.
- Ø Inflamación de los tobillos.
- Ø Dificultad para respirar.
- Ø Desmayos, adormecimiento y dolor en las manos, cansancio y debilidad muscular.

Si presenta alguno de los efectos secundarios descritos, informe a su médico tratante.



www.valledellili.org

Programa educativo al paciente oncológico y su familia

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185

