



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

TRAMETINIB - TABLETAS

¿Para qué sirve el medicamento?

Tratamiento del melanoma y el cáncer de pulmón.

Antes de tomar el medicamento informe a su médico si presenta:

- 0 Si sufre de afecciones cardiacas como la disminución de fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
- 0 Si tiene antecedentes de haber sufrido desmayos de origen desconocido.
- 0 Antecedente de haber sufrido alergia al trametinib.
- 0 Si sufre de algunas de las siguientes enfermedades hipertensión, diabetes, la hipercolesterolemia, glaucoma, diverticulitis.
- 0 Informe si toma medicamentos anticoagulantes.
- 0 Informe si considera la maternidad o se encuentra amamantando al momento de iniciar el tratamiento con trametinib.

Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- 0 Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de salud sexual y reproductiva o con el ginecólogo.
- 0 El uso de este medicamento en hombres o mujeres puede causar daño al bebé. Informe a su equipo de atención médica si usted o su pareja está embarazada, queda embarazada durante el tratamiento o si está amamantando.
- 0 Si existe alguna posibilidad de que usted o su pareja puedan quedar en embarazo, juntos deben:
 - Usar 2 métodos anticonceptivos efectivos al mismo tiempo mientras toma este medicamento.
 - Este medicamento puede reducir la efectividad de las píldoras anticonceptivas basadas en hormonas. Use otro método anticonceptivo.
 - Siga usando métodos anticonceptivos durante 4 meses después de la última dosis.

- 
- ⦿ No amamante mientras usa este medicamento.
 - ⦿ Este medicamento puede afectar la fertilidad (capacidad de quedar embarazada).



Otras recomendaciones:

- ⦿ Guarde el medicamento en su empaque original.
- ⦿ Una vez la botella sea abierta, las tabletas se pueden guardar en el refrigerador solo por 30 días.
- ⦿ Almacene en un lugar seco, a temperatura ambiente, lejos del calor y la luz.
- ⦿ Mantenga fuera de la vista y del alcance de los niños y mascotas.
- ⦿ No arroje ningún medicamento sin usar en su casa. Llévelos a su farmacia para desecharlos de manera segura.

Manipulación segura del medicamento:

El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- ⦿ Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: Lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- ⦿ Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- ⦿ Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

IMPORTANTE:

- ⦿ Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe a su médico.
 - ⦿ Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.
- 



¿Cómo tomar el medicamento?

- ⦿ El tiempo y la dosis del medicamento lo define su médico tratante.
- ⦿ Puede tomarse sin alimentos a la misma hora todos los días al menos 1 hora antes o 2 horas después de una comida.
- ⦿ La tableta debe tomarse entera con agua y no triturrarse, partirse o masticarse.
- ⦿ Si olvida una dosis, tómela si está dentro de las 12 horas de la dosis omitida, de lo contrario, omita y tome su próxima dosis según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada.
- ⦿ Es posible que necesite tabletas de más de 1 concentración para obtener la dosis correcta. Asegúrese de identificar las tabletas correctamente para obtener la dosis correcta.
- ⦿ Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o enfermera la forma de dilución y administración.
- ⦿ Si vomita la dosis de trametinib, no tome una segunda dosis.
- ⦿ No se recomienda consumir con alimentos y en especial con alimentos con alto contenido de grasa.
- ⦿ Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos como puede provocar que el tratamiento no funcione bien o cause efectos secundarios graves.
- ⦿ Comente con su médico los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.



Efectos secundarios del medicamento:

- Ø Erupción cutánea.
- Ø Diarrea o estreñimiento.
- Ø Náuseas y vómitos.
- Ø Cambios en las uñas y la piel, caída del cabello.
- Ø Hipertensión.
- Ø Dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor muscular y articular.
- Ø Fiebre.
- Ø Lesiones en la boca y sangrado por encías.
- Ø Inflamación de las extremidades.
- Ø Cansancio.
- Ø Dolor en el pecho, dificultad para respirar, tos.
- Ø Sangrados por varias partes del cuerpo: orina, deposición, encías, entre otros.
- Ø Cambios en la visión como visión borrosa o dolor ocular.
- Ø Sequedad en la boca, dificultad para tragar o cambios en el sabor.
- Ø Debilidad muscular.
- Ø Dolor de garganta.

Si presenta alguno de los efectos secundarios descritos, informe a su médico tratante.



www.valledellili.org

Programa educativo al paciente oncológico y su familia

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185

